

МРТ внутренних органов / МР-урография (почки, мочеточники)

- Строго натощак (не есть и не пить за 6-8 часов)
- Не есть в течение двух суток газообразующие продукты (овощи, хлеб, фрукты, кисломолочные продукты)
- Рекомендуется прием препаратов, снижающих газообразование. На исследование принести результаты УЗИ ОБП

КТ мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь)

- Натощак, не есть за 4 часа до исследования
- Рекомендуется прием препаратов, снижающих газообразование.
- Наполненный мочевой пузырь – не мочиться 1,5-2 часа

МРТ и КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники)

МРТ:

- Строго натощак. Не есть и не пить за 6 часов до исследования
- В течение двух суток до исследования не употреблять газообразующие продукты: овощи, хлеб, фрукты, кисломолочные продукты

КТ:

- Строго натощак. Не есть за 6 часов до исследования, лекарства принимать можно
- Перед исследованием выпить 1 л воды в два приема: первую половину – за 2 часа до исследования, вторую – непосредственно перед исследованием

МРТ и КТ органов малого таза

МРТ:

- За два дня до исследования легкая диета с исключением продуктов, усиливающих перистальтику и газообразование в кишечнике (черного хлеба, отрубей, бобовых, сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, газированных напитков)
- Не есть последние 3-4 часа перед исследованием
- За час до исследования помочиться и больше не ходить в туалет. Исключение: если услуга проводится с целью исследования мочевого пузыря, то оно выполняется с наполненным мочевым пузырем: не мочиться за 2 часа до исследования, употреблять не более 1 стакана жидкости в этом интервале времени
- Для женщин рекомендовано исследование на 5-12 день цикла
- Если есть, мужчинам предоставить анализ на ПСА

КТ:

- Опорожнить кишечник перед исследованием

- Исключить газообразующие продукты
- Для женщин исследование проводится на 7-12 день менструального цикла
- Не мочиться за 2 часа до проведения исследования